SRS PFLEGEPLANER 2020

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

KW: 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Pflegemaßnahmen:

Bodenprobe	Nährstoffanalyse	
Düngen	SRS Dynamic-Sport 20-30 g/m²	Frühjahr; Sommer; Herbst
Düngen mit SRS K-Tec	SRS K-Tec 20-30 g/m²	SRS K-Tec 30 g/m²
Mähen	Wöchentliche Mähgänge Mähgutaufnahme nach Erfordernis	
Beregnung	Je nach Niederschlagsmenge	
Filzentfernung	Striegeln	

SRS Sportrasen-Regeneration:

Vertikutieren		
Aerifizieren	Je nach Belastung und Qualität der Rasentragschicht	
Tiefenlockerung	Je nach Belastung und Qualität der Rasentragschicht	
Besanden	3-10 Ltr./m² schluffkornarmer Sand nach dem Vertikutieren o. Aerifizieren	
SRS Öko-Schlitz®System	Je nach Belastung und Qualität der Rasentragschicht	
Nachsaat		

Wichtige Termine	

Bodenprobe	*Vor Beginn der Vegetationszeit wird anhand von Bodenproben der Nährstoffgehalt festgestellt, um anschließend bedarfsgerecht düngen zu können.*
Düngen	*In der Vegetationszeit wird dreimal mit SRS Dynamic-Sport gedüngt: März/April, Mai/Juni und August.*
Düngen mit SRS K-Tec	*Eine Herbstdüngung mit SRS K-Tec bereitet die Rasengräser auf den Winter vor. Im zweiten Standjahr sollte die Düngung um 30% erhöht werden.*
Mähen	*Während der Hauptwachstumsphase wird bis zu 2x wöchentlich gemäht. Bei günstigen Witterungsbedingungen kann eine Mähgutaufnahme notwendig sein, da ein vitaler Rasen enorme Biomasse produziert.*
Beregnung	*Die Beregnung richtet sich nach den Niederschlagsmengen. Wieviel und wann beregnet wird, ist individuell auf den jeweiligen Platz abzustimmen. Vorausschauende Wetterbeobachtungen sind ebenso wichtig.*
Filzentfernung	*Während der Wachstumsperiode wird die Rasenfläche bei DIN-Plätzen und sandigen Tragschichten im Abstand von 3 bis 4 Wochen gestriegelt, um entstehenden Filz zu beseitigen.*
Vertikutieren	*Wird Vertikutieren notwendig, so erfolgt dies in der Zeit des intensivsten Pflanzenwachstums im Mai/Juni und danach im August/September.*
Aerifizieren	*Intensiv genutzte Spielflächen müssen aufgrund der starken Belastung während der Sommermonate aerifiziert werden, um eine bessere Düngemittelverwertung und aktives Bodenleben zu erreichen. So kann ein großflächiges Absterben verhindert werden.*
Tiefenlockerung	*Die Tiefenlockerung wird in regelmäßigen Abständen vorgenommen, möglichst das ganze Jahr hindurch.*
Besanden	*Das Besanden ist immer dann notwendig, wenn ein Filzabbau (Vertikutieren) oder eine Belüftung (Aerifizieren) vorgenommen wurde. Es verhindert ein erneutes schnelles Verdichten des Bodens.*
SRS Öko-Schlitz®System	*Das SRS Öko-Schlitz-System findet im Zeitraum April-September Anwendung und richtet sich nach der Qualität und der Belastung der Rasentragschicht.*
Nachsaat	*Eine Nachsaat wird, wo sie erforderlich ist, in der Zeit des größten Pflanzenwachstums vorgenommen. So schließen sich Lücken in der Grasnarbe am schnellsten. Die Nachsaat ist nur dann empfehlenswert, wenn die Rasenfläche nicht bespielt wird.*

Design info@afkg.de